


How sick is *too sick?*



3 main reasons to stay home:

1. Your child does not feel well enough to participate comfortably in usual activities (such as extreme tiredness, persistent crying, or unexplained irritability).
2. Your child needs more care than staff/teachers are able to provide.
3. Your child shows symptoms which appear on the following list:

**SYMPTOM:
FEVER**

*100.4 F or above with
behavior change or illness*

**SHOULD YOUR CHILD STAY HOME?
YES**



**SYMPTOM:
FLU SYMPTOMS**

*Fever, coughing, vomiting,
rash, sore throat*

**SHOULD YOUR CHILD STAY HOME?
YES**

For at least 24 hours



**SYMPTOM:
VOMITING**

*Two or more different
incidents within 24 hours*

**SHOULD YOUR CHILD STAY HOME?
YES**

*Until vomiting stops or the doctor
says it is no longer contagious*



**SYMPTOM:
DIARRHEA**

*Not because by diet
or medication*

**SHOULD YOUR CHILD STAY HOME?
YES**

If more than 2 episodes that morning



**SYMPTOM:
MILD COLD SYMPTOMS**

*Stuffy nose, mild
coughing, sneezing*

**SHOULD YOUR CHILD STAY HOME?
NO**





¿Que tan enfermo es *muy* enfermo?

3 razones principales para quedarse en casa:

1. Su hijo/a no se siente suficientemente bien para participar cómodamente en actividades habituales (tales como cansancio extremo, llanto persistente, irritabilidad inexplicable).
2. Su hijo/a necesita más cuidado del que el personal o los maestros/as pueden proporcionar.
3. Su hijo/a muestra síntomas que aparecen en la siguiente lista:


SÍNTOMA:
FIEBRE DE 100.4 O MÁS
Con cambio de comportamiento o enfermedad

¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA?
SÍ



SÍNTOMA:
SÍNTOMAS DE LA GRIPE
Fiebre, tos, vómitos, erupción cutánea, dolor de garganta

¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA?
SÍ
Por lo menos 24 horas



SÍNTOMA:
VÓMITOS
Dos o más incidentes diferentes en 24 horas

¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA?
SÍ
Hasta que los vómitos cesen o el medico diga que ya no es contagioso



SÍNTOMA:
DIARREA
Que no sea el resultado de la dieta de su niño/a o las medicinas

¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA?
SÍ
Si suceden más de dos episodios durante la mañana



SÍNTOMA:
SÍNTOMAS LEVES DE RESFRIADO
Congestión, tos leve, estornudos

¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA?
NO



How sick is *too sick?*

3 main reasons to stay home:

1. Your child does not feel well enough to participate comfortably in usual activities (such as extreme tiredness, persistent crying, or unexplained irritability).
2. Your child needs more care than staff/teachers are able to provide.
3. Your child shows symptoms which appear on the following list:

INFLUENZA	SYMPTOM: FEVER <i>100.4 F or above with behavior change or illness</i> SHOULD YOUR CHILD STAY HOME? YES
COUGH	SYMPTOM: FLU SYMPTOMS <i>Fever, coughing, vomiting, rash, sore throat</i> SHOULD YOUR CHILD STAY HOME? YES <i>For at least 24 hours</i>
VOMITING	SYMPTOM: VOMITING <i>Two or more different incidents within 24 hours</i> SHOULD YOUR CHILD STAY HOME? YES <i>Until vomiting stops or the doctor says it is no longer contagious</i>
DIARRHEA	SYMPTOM: DIARRHEA <i>Not because by diet or medication</i> SHOULD YOUR CHILD STAY HOME? YES <i>If more than 2 episodes that morning</i>
ACHES	SYMPTOM: MILD COLD SYMPTOMS <i>Stuffy nose, mild coughing, sneezing</i> SHOULD YOUR CHILD STAY HOME? NO

For more information, please contact your child's school
or visit www.providenceschools.org

¿Que tan enfermo es estar *muy* enfermo?

3 razones principales para quedarse en casa:

1. Su hijo/a no se siente suficientemente bien para participar cómodamente en actividades habituales (tales como cansancio extremo, llanto persistente, irritabilidad inexplicable).
2. Su hijo/a necesita más cuidado del que el personal o los maestros pueden proporcionar.
3. Su hijo/a muestra síntomas que aparecen en la siguiente lista:

GRUPE	SÍNTOMA: FIEBRE DE 100.4 O MÁS <i>Con cambio de comportamiento o enfermedad</i> ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA? SÍ
TOS	SÍNTOMA: SÍNTOMAS DE LA GRUPE <i>Fiebre, tos, vómitos, erupción cutánea, dolor de garganta</i> ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA? SÍ <i>Por lo menos 24 horas</i>
VOMITOS	SÍNTOMA: VÓMITOS <i>Dos o más incidentes diferentes en 24 horas</i> ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA? SÍ <i>Hasta que los vómitos cesen o el medico diga que ya no es contagioso</i>
DIARREA	SÍNTOMA: DIARREA <i>Que no sea el resultado de la dieta de su niño/a o las medicinas</i> ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA? SÍ <i>Si suceden más de dos episodios durante la mañana</i>
DOLORES	SÍNTOMA: SÍNTOMAS LEVES DE RESFRIADO <i>Congestión, tos leve, estornudos</i> ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO EN CASA? NO

Para más información, llame a la escuela de su niño
o visite www.providenceschools.org